

Выжеребка



Сроки жеребости

Средний срок
вынашивания жеребенка
335 дней или 11 месяцев.

Вариант нормы от **320-380**
дней или 10,5-13 месяцев.




Менеджмент жеребой кобылы

- ▶ Все необходимые ветеринарные манипуляции проводить до случки или осеменения. (Подпилка зубов, обработки от гельминтозов, плановые прививки от сибирской язвы, лептоспироза, дерматофитов и т.п.)
- ▶ Первые 3 месяца жеребости желательно никакие манипуляции не делать.
- ▶ После 3-х месяцев необходимо провести вакцинацию от ринопневмонии согласно рекомендованным наставлениям.
(СВ/69- 3 и в 6,5 месяцев, импортные на 5,7,9 жеребости)
- ▶ Вакцинацию от гриппа желательно проводить на последних месяцах жеребости, для того, чтобы у кобылы сформировался напряженный иммунитет и она смогла передать антитела новорожденному жеребенку с молозивом.
- ▶ Обработки от гельминтов. Проводить можно и нужно! Препараты содержащие действующие вещества: фенбендазол (Панакур), ивермектин, пирантела считаются безопасными для жеребых кобыл.

Подготовка к выжеребке

- ▶ Переезд или перестановка в другую конюшню минимум за 6 недель до выжеребки! Это необходимо для того, чтобы иммунная система кобылы адаптировалась к местной микрофлоре.
- ▶ Кобыла должна продолжать двигаться до самой выжеребки. Профилактика отеков и затруднительных родов.
- ▶ В доступе всегда должна быть свежая питьевая вода.
- ▶ Денник для выжеребки должен быть минимум 4*5 м, застелен чистой соломой.
- ▶ Если у кобылы была сделана операция Каслика, то за 2-3 недели до шов родов убираем.
- ▶ Если молозиво активно отделяется из вымени, имеет смысл немного сдоить и заморозить, так как с молозивом выходят иммуноглобулины, которые мать должна передать новорожденному жеребенку.




Подготовка к выжеребке

- ▶ За 2-3 недели вымя увеличивается в размерах, вдоль крестца по обеим сторонам появляются впадины (расслабление мышц и связок таза).
- ▶ За 3-5 дней до выжеребки живот опускается вниз, как бы уменьшаясь в размерах (жеребенок встает в родовые пути).
- ▶ Половые губы удлиняются.
- ▶ Определение примерного срока выжеребки по тестполоскам pH.


Тест-полоски должны быть со шкалой от 8-5,5 pH.

Капля молока наносится на индикатор и тут же сравнивается со шкалой. Если pH больше **↑** 6,4, то в ближайшие 24 часа кобыла скорее всего рожать не будет, если pH 6,4 или **↓** то роды наступят в ближайшие 72 часа.






Подготовка к родам



Роды



3 стадии родов:

- ▶ **первая стадия подготовительная.** Длиться от 30 минут до 4 часов.

Кобыла беспокоится, оглядывается на живот, приподнимает хвост, часто мочится, может часто ложиться, вставать, копать. Это связано с маточными сокращениями, раскрытием шейки матки и заниманием жеребенка родовых путей. Первая стадия родов заканчивается появлением в просвете вульвы «Белого мешка» хориоалантойса, его разрывом и излитием вод.

Если в просвете вульвы мы видим появление «Красного мешка», то значит плацента преждевременно отделилась и питание жеребенка нарушено, жеребенок испытывает гипоксию.



Роды

- ▶ **Вторая стадия** длится 20-30 минут.

Полное раскрытие шейки матки, плод входит в таз, сильные сокращения мышц живота и матки. Кобыла лежит на боку. В течение 5 минут после разрыва хориоалантойса и излитии вод должен появиться амнион (белая блестящая оболочка), потом ножка, вначале одна и сразу за ней другая. Копыта должны быть направлены подошвой вниз. Роды продолжаются, появляется головка. На этом этапе, кобылы иногда встают, немного походят и снова ложатся.



Роды

- ▶ Если в процессе родов амнион не порвался, то его обязательно разрываем, освобождая дыхательные пути.
- ▶ После рождения жеребенка кобыла обычно отдыхает минут 20, в этот момент стараемся ее не беспокоить. Пуповина обычно обрывается сама при вставании кобылы или жеребенка.
- ▶ Если необходимо вручную отделить пуповину, то делаем это после того, как прекратится пульсация пуповины на расстоянии 5 см от живота.
- ▶ Осматриваем пуповину на предмет остаточного кровотечения, обрабатываем раствором 0,5 % **хлоргексидина** несколько раз за день.

Йод не желательно использовать, так как он сушит кожу, она трескается, что способствует размножению микробов.



Роды

- ▶ **Третья стадия родов** заключительная, длится от 30 минут до 3 часов.

Отделение последа и инволюция матки. Висящую часть последа желательно подвязать в узел, чтобы лошадь не наступила и не порвала его.

Если послед не отделяется в течение 3 часов или висящая часть последа вошла обратно в матку, то необходимо вызвать врача для его удаления в срочном порядке.

- ▶ Через 3-5 дней после родов в норме должны прекратиться выделения из вульвы.
- ▶ Через 7-10 дней после родов кобыла приходит в охоту.



Новорожденный жеребенок

- ▶ Через минуту после рождения или раньше делает первый вздох, сердечный ритм выравнивается.
- ▶ Через 5 минут должен появиться сосательный рефлекс.
- ▶ Через 30 минут первые попытки встать.
- ▶ Через 1-2 часа самостоятельно встают и передвигаются.
- ▶ Через 1-3 часа находят вымя и делают первые глотки молозива.

Очень важно оценить качество молозива, так как при недостаточном содержании иммуноглобулинов, мать не сможет передать жеребенку достаточное количество антител, что приведет к иммунодефициту и возможной септицемии.

- ▶ Отхождение мекония (первородного кала) иногда затруднительно, особенно для жеребчиков. На заводах стараются всем жеребяткам без исключения делать клизму для профилактики закупорки кишечника.

